

Indikationen und Diagnosen aller Kassen

Parameter	§2 Kassen (GKO)	SVS-LW+GW	BVAEB-OEB+EB
ACE	Va auf Sarkoidose	Va auf Sarkoidose	Va auf Sarkoidose
AFP	bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Qu.)	bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Qu.)	bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Qu.)
AMH	Endometriose, PCO-Syndrom, Beg. Klimakterium (abgeschl. Kinderwunsch), Geplante OP Ovar oder Status post Ovar OP	Endometriose, PCO-Syndrom, Beg. Klimakterium (abgeschl. Kinderwunsch), Geplante OP Ovar oder Status post Ovar OP	Endometriose, PCO-Syndrom, Beg. Klimakterium (abgeschl. Kinderwunsch), Geplante OP Ovar oder Status post Ovar OP
Ammoniak	Verdacht auf hepatische Enzephalopathie	Keine DG erforderlich	Keine DG erforderlich
Androstendion	DD der Hyperandrogenämie, Hirsutismus, V.a. Androgenitales Syndrom, Virilismus	Keine DG erforderlich	Keine DG erforderlich
APC	fam. Thromboseeigung	Thrombophiliediagnostik	Thrombophiliediagnostik
Beta-2-Mikoglobulin	bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Qu.)	Keine DG erforderlich	Keine DG erforderlich
B12	Anämie	Anämie	Anämie
Blutgruppe	Mukipa od. bei präoperativ	Mukipa od. bei präoperativ	Mukipa od. bei präoperativ
BNP	V.a. Herzinsuffizienz	wird 1x im Jahr bez.	wird 1x im Jahr bez.
CA125	bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Qu.)	bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Qu.)	bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Qu.)
CA153	bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Qu.)	bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Qu.)	bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Qu.)
CA199	bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Qu.)	bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Qu.)	bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Qu.)
Calcitonin	Diagnostik u Verlaufsko. des medullären SD-Karzinoms	nur bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Quartal)	nur bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Quartal)
Calprotectin	nur im Rahmen der Morbus Crohn- u. Colitis Diagnostik und zur Abgrenzung CED zu Reizdarm; zur Verlaufskontrolle von Colitis Ulcerosa bzw. Morbus Crohn 1mal pro Tag und höchstens 3mal im Quartal verrechenbar. Besteht der Patient nach Aufklärung durch den Zuweiser dennoch auf die Durchführung eines weiteren Tests, können die Kosten dafür eingefordert werden.	wird nicht bez. Kosten 30,00€	wird nicht bez. Kosten 30,00€
CCP	V.a. rheumatoide Arthritis oder chron. Polyarthrit	V.a. rheumatoide Arthritis oder chron. Polyarthrit	V.a. rheumatoide Arthritis oder chron. Polyarthrit
CEA	Nur zur Verlaufsko. nach Colorectal- od. Mammacarcinomen	bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Qu.)	bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Qu.)
CK-MB	V.a. Myocardinfarkt	V.a. Myocardinfarkt	V.a. Myocardinfarkt
COERULOPLASMIN	Hepatitismarker-negative Lebererkrank. im Kindes- und Jugendalter, mikroze. eisenfraktäre Anämie	Keine DG erforderlich	Keine DG erforderlich
C-Peptid	DM (Diabetes mellitus)	DM (Diabetes mellitus)	DM (Diabetes mellitus)
DDIMER	V.a. Lungenembolie, Va PE oder V.a. TVT	Keine DG erforderlich	Keine DG erforderlich
DHEAS	Adrenogenitales Syndrom, DD adrenale und ovarielle Testosteronerhöhung, Virilismus, DD von Zyklusstörungen	Keine DG erforderlich	Keine DG erforderlich
ENDOMYSIALE AK	V.a. Zöliakie	V.a. Zöliakie	V.a. Zöliakie
FOLSÄURE	Anämie	Anämieabklärung	Anämieabklärung
FV PCR	bei path. APC Kassenleistung (PRIVAT: 52,90 €)	nur bei Thrombophiliediagnostik (PRIVAT: 58,00€)	nur bei Thrombophiliediagnostik (PRIVAT: 58,00€)
GLIADIN AK	V.a. Zöliakie	V.a. Zöliakie	V.a. Zöliakie
HAEMOCHROMATOSE	Ferritin > 500 o. EBK > 45% (PRIVAT 75,60€)	PRIVAT 58,00€	PRIVAT 58,00€

Indikationen und Diagnosen aller Kassen

Parameter	§2 Kassen (GKO)	SVS-LW+GW	BVAEB-OEB+EB
HLA-B27	V.a. Morbus Bechterew	V.a. Morbus Bechterew	V.a. Morbus Bechterew
HOMOCYSTEIN	Ausschluss tiefer Beinvenenthrombosen bzw. Lungenembolien	wird nicht bez. Kosten 38,70€	wird nicht bez. Kosten 38,70€
Insulin	DM (Diabetes mellitus)	DM (Diabetes mellitus)	DM (Diabetes mellitus)
LEICHTKETTEN	wird nicht bezahlt 23,50€	Kassenleistung	Kassenleistung
PROTEIN C	Thrombophiliediagnostik	Thrombophilie bis 50 Jahre	Thrombophilie bis 50 Jahre
PROTEIN S	Thrombophiliediagnostik	Thrombophilie bis 50 Jahre	Thrombophilie bis 50 Jahre
PSA		1x im Jahr bez. Bei M. über 45 J. bei malign.Tu: 1x/Qu.	1x im Jahr bez. Bei M. über 45 J. bei malign.Tu: 1x/Qu.
THYROGLOBULIN (TG)	bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Qu.)	bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Qu.)	bei gesicherten malignen Tumoren, (2 Marker/Qu.)
TRAK	Thyreoiditis, Mb. Basedow, Autoimmunhyperthyreose	Thyreoiditis, Mb. Basedow, Autoimmunhyperthyreose	Thyreoiditis, Mb. Basedow, Autoimmunhyperthyreose
TROPONIN I hochsens.	V.a. Myocardinfarkt od V.a. Angina pectoris	V.a. Myocardinfarkt od V.a. Angina pectoris	V.a. Myocardinfarkt od V.a. Angina pectoris
TTG-IGA	V.a. Zöliakie	V.a. Zöliakie	V.a. Zöliakie
Tumormarker	nur bei malignen Geschehen	nur bei malignen Geschehen	nur bei malignen Geschehen
VITD	Osteoporose, starke Muskel- schmerzen, Malabsorption, Gastric Bypass, nachgewiesener VitD Mangel	V.a. Vitamin D Mangel	V.a. Vitamin D Mangel
ZINK	bei klinischen Hinweisen auf Zinkmangel, z.B. therapieresistente Dermatosen, Haarausfall	Keine DG erforderlich	Keine DG erforderlich

Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte.